

# SOĞUK ALGINLIĞI MEVSİMSEL GRİP VE DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ ARASINDAKİ FARKLAR

BELİRTİLER	SOĞUK ALGINLIĞI	MEVSİMSEL GRİP	DOMUZ GRİBİ
ATEŞ	Çok nadir görülür	Genellikle görülür	Sıklıkla rastlanır Domuz gribine yakalananların yüzde 80'inde 38.3 derece ateş görülür
ÖKSÜRÜK	Kesik ve balgamlı öksürük olarak görülür	Kuru ve kesik öksürük belirtilerinden biridir	Kesinlikle balgamsız ve halk arasında kuru öksürük olarak bilinen şekilde görülür
AĞRI	Hafif vücut ağrıları görülebilir	Orta dereceli vücut ağrısı olarak görülür	Ciddi boyutlarda acı verici vücut ağrısı domuz gribinde yaygındır
BURUN AKINTISI	Kendi kendine geçecek bir haftalık burun akıntısına rastlanır	Yaygın bir belirtidir	Domuz gribinde çok az görülür
SITMA	Soğuk algınlığında sık rastlanır bir belirti değildir	Hafif ve orta dereceli bir sitma görülebilir	Domuz gribi olanların yüzde 60'nda sitmalanma görülmüştür
HALSİZLİK	Hafif derecede halsizlik görülebilir	Yaygın ve orta dereceli olarak görülür	Ciddi derecede halsizlik görülür
HAPŞIRMA	Yaygın görülen belirtidir	Sıklıkla görülür	Domuz gribinde sık görülmez
ANI SEMPTOMLAR	Bir iki gün arasında belirtiler görülür	Bir iki içinde yüzde kızarıklık, istah kaybı, baş dönmesi ve kusma gibi görülen belirtiler 4 ila 7 gün sürebilir. İshal de yaygın olarak görülür	Domuz gribinin belirtileri 3 ila 6 saat arasında hızlı bir şekilde gelişir. Yüksek ateş, ağrı ve sıvı gibi görülen belirtilerin süresi hastaya göre 4 ila 7 gün arasında değişebilir İshal yaygındır
BAŞ AĞRISI	Sık rastlanmaz	Yaygın olarak görülür	Domuz gribinde sık olarak görülmez
BOĞAZ AĞRISI	Sık olarak görülür	Genelde rastlanır	Domuz gribinde sık olarak görülmez
NEFES DARLIĞI	Hafif bir şekilde görülebilir	Orta dereceli nefes darlığı görülebilir	Açı verecek şekilde görülür